




Réunion d'information FCO-8 en Isère

Mise à jour du 02-09-2024



Au programme

- Actualités, situation épidémiologique
- Signes cliniques
- Règlementation et mouvements
- Concours-comices
- Alpages
- Vaccination
- Aides
- Equarrissage
- FCO 3



Actualités, situation épidémiologique : FCO BTV 8



FCO BTV 8

2006 : FCO BTV 8 détecté pour la première fois en France.

2015 : Réémergence après une période 3 ans. La France avait retrouvé un statut indemne suite à une vaccination massive.

Depuis, FCO 8 régulièrement détectée mais signes cliniques très rares.

1^{er} Janvier 2018 : La France continentale et la Corse sont totalement en zone réglementée pour la FCO 4 et 8.


Août 2023 : Nouvelle souche de FCO BTV 8 avec impact clinique, dans le Sud Ouest.

Juillet 2024 : 1^{er} cas FCO 8 en Isère

14 Août 2024 : 31 foyers confirmés, 100 suspicions

22 Août 2024 : 60 foyers confirmés, 280 suspicions

01 Septembre 2024 : 308 foyers confirmés, 589 suspicions



Signes cliniques FCO BTV 8



Diaporama de l'Anses

Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail



anses



Signes Cliniques

❑ Quelle est la durée de la maladie au sein d'un élevage ?

- ✓ Incubation de 6 à 8 jours. Evolution différente selon l'activité des vecteurs, l'espèce, la structuration de l'élevage et la conduite du troupeau.
- ✓ Règlementation européen (LSA) demande 2 ans sans aucun cas avant de considérer le cheptel sain.
- ✓ Expérience de l'an dernier : début des infections début août, explosion des cas mi-août, puis doublement des foyers tous les 3-4 jours, épizootie jusqu'à novembre.



Signes Cliniques

❑ Quel est le niveau de séropositivité dans un élevage ? De mortalité ?

- ✓ Différent selon l'activité des vecteurs, l'espèce, la structuration de l'élevage et la conduite du troupeau.
- ✓ Etude réalisée à partir d'une enquête par le GDS Aveyron pour les cheptels touchés entre août et septembre 2023 :
 - Cheptels touchés : 13 % élevages bovins et 10 % élevages ovins déclarés foyers
 - Morbidité : 1 % à 73 % bovins adultes et 0,3 à 47 % ovins adultes malades
 - Mortalité : de 0 à 5 % bovins adultes et de 0 à 31% des ovins adultes
 - /!\ chiffres sous-estimés car trop peu de jeunes animaux (- 6 mois) présents ; continuation des cas après l'enquête.
- ✓ Etude des impacts technico-économiques en 2007 en ovin allaitant, Institut de l'Elevage :
 - Confirme que les adultes sont plus touchés que les jeunes (morbidité et mortalité).

❑ Est-ce que les béliers deviennent stériles après avoir contracté la FCO ?

- ✓ Oui, temporairement. La fièvre peut stopper la spermatogénèse, qui en temps normal dure 2 mois.
- ✓ A priori, quelques cas liés spécifiquement à la FCO ont été recensés mais rien n'est clairement prouvé → lié au virus qui se loge dans les parois des vaisseaux sanguins et particulièrement les vaisseaux sanguins des testicules.



Règlementation et mouvements



Règlementation : Analyses - Laboratoire

➤ Dès la suspicion clinique :

- Contacter votre vétérinaire sanitaire
- Il établira un diagnostic clinique + **3 prélèvements maxi par cheptels**
- /!\ Dorénavant uniquement suspicion FCO (recherche MHE si FCO nég)
- Labo = ~~LA01 (jusqu'au 13/08)~~
Chemin de la Vallée - Cénord
CS 70408
01012 Bourg en Bresse Cedex


Jusqu'au 15/09/2024

Depuis le 02 septembre 2024 : envoi des prélèvements de nouveau en Savoie au LVD 73



Règlementation : Mouvements

- Instruction technique du 1^{er} mars 2023
- France non indemne pour sérotype 4 et 8 et sans programme d'éradication
- Départ vers tous Etats membres possible avec vaccination :
 - 2 protocoles de vaccination pour export intra-UE :
 - Vaccination contre sérotypes 4 et 8 depuis au moins 60 jours
 - Vaccination effective + PCR négative




Règlementation : Mouvements



- **Export vers l'Italie**


- Dérogations possibles :



Règlementation : Mouvements



- Export vers l'Espagne et le Portugal
 - Dérogations possibles :



Concours et comices



Concours Départemental

- **Concours départemental** : A Lans en Vercors les 24 et 25 août, arrivée des animaux le 23 août.
- **Mesures complémentaires prises dès l'annonce des cas en Isère, le 7 août :**
 - ✓ Désinsectisation immédiate des ruminants par les éleveurs, avec attestation à renvoyer au GDS
 - ✓ Maintien de la désinsectisation jusqu'au rassemblement
- **Renforcement des mesures sanitaires le 15 août :**
 - ✓ Désinsectisation des moyens de transport
 - ✓ Gestion aux cas par cas de la situation de chaque cheptel

Taux de participation au concours départemental

		Prévus	Présents	% de présence
Laitières	Nombre d'élevages	77	41	54,5 %
	Nombre de bovins	396	126	31,8 %
Charolais	Nombre d'élevages	11	6	54,5%
	Nombre de bovins	104	39	35,8 %
Limousins	Nombre d'élevages	13	9	69,2%
	Nombre de bovins	113	54	47,8 %
Total	Nombre d'élevages	101	56	55,4 %
	Nombre de bovins	613	219	35,7%

- **Autres comices** : mêmes recommandations
 - ✓ Balcon de Belledonne le 25 août
 - ✓ St Albin de Vaulserre le 31 août
 - ✓ ~~Trièves, Prébois le 7 septembre~~ **pas de bovins ni d'ovins**
 - ✓ ~~Nord Dauphiné, Roche le 7 septembre~~ **ANNULE**




Beaucroissant

- **Foire d'automne** : Les 13, 14 et 15 septembre
- **Concours Charolais, mesures complémentaires prises le 14 août** :
 - Plus de temps pour réagir
 - ✓ Désinsectisation immédiate des ruminants par les éleveurs, avec attestation à renvoyer
 - ✓ Analyse PCR 14 jours après le début de la désinsectisation
 - ✓ Maintien de la désinsectisation jusqu'au rassemblement
 - ✓ Désinsectisation des moyens de transport
 - ✓ Désinsectisation du chapiteau

Concours maintenu, les éleveurs qui ne sont pas dans la zone régulée ne peuvent pas venir : concerne 2 éleveurs ardéchois.

- **Absence de l'association des éleveurs ovins de l'Isère**
- **Quelle gestion pour le foirail ?**
 - ✓ **Protocole aligné sur le concours charolais**



Alpages



Gestion en alpage

- **A ce jour, pas de cas déclaré en alpage** → anticiper une éventuelle contamination
 - ✓ Vaccination des animaux en estive dès aujourd'hui ?
 - Double contention à 3 semaines d'intervalle pour les bovins
 - ✓ Désinsectisation régulière ?
 - Résidus dans l'environnement ?

- **Message fait par GDS PACA aux transhumants ovins**
 - ✓ Le 14/08/2024 : Conseil de vacciner

- **Info de la FAI :**
 - ✓ A tous les alpagistes le 16/08/2024
 - ✓ Aux parcs et espaces naturels le 19/08/2024 → soulevé plusieurs questions
 - Effet des anti-inflammatoires sur les vautours → méloxicam, a priori non nocif = à prioriser en alpage
 - Effet des euthanasiants sur les vautours → T61 est interdit depuis plusieurs années pour les cadavres laissés à l'équarrissage naturel
 - Résidus sur les zones de captage ?
 - Présence des culicoïdes en altitude ? → présence prouvée + infection prouvée à 1 600 m, des incertitudes au-delà



Vaccination



Vaccination

➤ L'Anses conseille de vacciner

- ✓ Efficacité prouvée sur la nouvelle souche du sérotype 8
- ✓ Vaccination même si le virus circule dans le cheptel → **CONSEIL de l'ANSES, du SNGTV et de GDS France**
 - **Ne pas vacciner les animaux symptomatiques**
 - Effet bénéfique du vaccin par rapport aux symptômes
 - En 2023, dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, retours des vétérinaires :

« En deux mois, nous avons passé la consommation de 2 ans d'anti-inflammatoires »

→ Retour du GDS 12 :

« Les cas reprennent depuis une dizaine de jours, surtout chez les bovins, car ils ont été, sûrement, moins vaccinés que les ovins.
Concernant la vaccination en urgence l'an dernier : il n'y a eu aucune conséquence due au vaccin. Au contraire, les cheptels touchés avaient de la mortalité forte et étalée dans le temps donc cela vaut vraiment la peine de recommander de vacciner même en début de contamination. »



Vaccination

➤ 3 vaccins sur le marché pour la FCO 8 :

	BTV Pur®	Syvazul®	Bluevac®
Sérotypes	4 et 8	4 et 8	8
Laboratoire	Boehringer	Syva	CZV
Espèces cibles	Bovins et ovins	Bovins et ovins (AMM) Conseillé QUE ovins	Bovins et ovins
Primovaccination	2 injections	1 injection	2 injections

➤ Stocks disponibles chez les fabricants (plus 1 million de doses chez Boehringer)

➤ Vaccination à la charge des éleveurs

✓ Faisable par l'éleveur, si pas besoin de certification officielle (exple : export), sinon faite par le vétérinaire sanitaire

➤ Coût moyen du vaccin pour les bovins : 5 à 10 € pour la primo-vaccination (2 injections)

➤ Coût moyen du vaccin pour les ovins : 3 à 5 € (1 injection)

↓
Rupture car grosse épidémie
de FCO 8 en Espagne



Vaccination

- Attention, un des vaccins FCO (en monodose), sensibilise l'animal à un excipient présent dans de nombreux médicaments : la **POVIDONE**.
- **Aucune étude ne prouve ou improuve ces réactions**, mais des remontées de terrain laissent à penser que les animaux vaccinés, peuvent faire, lors d'une injection ultérieure de médicaments les réactions suivantes :
 - rougeur de la peau, excitation de l'animal, cyanose des muqueuses, détresse respiratoire, prurit intense, hémorragie pulmonaire.

Ces effets secondaires (de choc anaphylactique) ont été observés en 2021-2022 sur des bovins, et depuis, le fabricant a changé de procédé de fabrication et nous avons beaucoup moins de retour. Pour cette campagne de vaccination, le vaccin monodose est réservé aux ovins donc ça ne devrait pas poser de problèmes...

SI VOUS CONSTATEZ DES EFFETS SECONDAIRES, SUITE A L'INJECTION D'UN MEDICAMENT SUR UN ANIMAL VACCINE, CONTACTEZ VOTRE VETERINAIRE POUR FAIRE REMONTER L'INFORMATION

⇒ **Avant d'injecter un médicament, regardez dans la notice la liste des excipients** (les petites lignes qu'on ne lit jamais....)

Exemple de médicaments contenant de la Povidone (et donc **POUVANT** induire un effet secondaire) **LISTE NON EXHAUTIVE** :

Antibiotiques : Terramycine solution injectable, Longicine, Terralon 20%, Cyclosol 200LA, Oxytétracycline; Cortexilline
Shotapen, Péni DHS, Dépocilline, Permacyl


Anti-inflammatoires : Dexalone suspension

Antiparasitaires : Flukiver, Panacur, Repidose....

Et bien sûr.. la bétadine solution et savon.



Aides



Prises en charge de l'Etat


➤ Si suspicion clinique, quelles prises en charge ?

- ✓ Déplacement du vétérinaire = Etat
- ✓ Acte de prélèvement sanguin = Etat
- ✓ Première série d'analyse PCR « all serotype » (validation si FCO ou non) = **Eleveur**
- ✓ Si FCO confirmée (si analyse all serotype positive), PCR pour déterminer quelles FCO (3,4, 8) = Etat

L'ensemble des analyses est pris en charge par l'Etat lors de suspicion clinique



Figure 1 : Représentation schématique du virus de la fièvre catarrhale ovine (protéines structurales et ARN double brin)



Aides : FMSE

➤ Programme 2023 exceptionnel

- ✓ Car explosion de cas avec signes cliniques
- ✓ Foyers déclarés entre le 01/07/2023 et 31/12/2023 avec symptômes
- ✓ PCR +
- ✓ Surmortalité sur 4 mois animaux de + 12 mois comparée à la moyenne des 3 ou 5 années précédentes sur les 4 mêmes mois
- ✓ Montants identiques au programme MHE

➤ Programme 2024 ?

- ✓ A priori ~~NON~~
- ✓ Car un mode de lutte existe = vaccination
- ✓ Considère que les éleveurs avaient le temps de vacciner pendant l'hiver

Le FMSE et le ministère sont en train d'étudier les aides qu'ils peuvent apporter (mortalité, baisse de production,...).




FONDS NATIONAL AGRICOLE DE
MUTUALISATION SANITAIRE ET
ENVIRONNEMENTALE



Maintien des primes

➤ Quid des primes ?

- ✓ ICHN ?
- ✓ **Plan loup ?**
- ✓ Prime à la brebis ?
 - Mortalité
 - Stérilité
 - Baisse de production
 - ...



La FCO est considérée comme "cas de force majeur" par le ministère : Vous pourrez conserver le droit des aides PAC même si les critères d'éligibilité ne sont pas respectés,

La demande est à faire à la DDT 38 par courrier dans un délai de 30 jours ouvrés à compter du moment où le bénéficiaire est en mesure de le faire, accompagnée de pièces justificatives permettant d'établir la réalité du diagnostic et l'ampleur des pertes liées à la maladie. Les demandes seront ensuite examinées au cas par cas.



Equarrissage



Equarrissage : Provalt

➤ Rappels :

- ✓ 48h, jour ouvré pour passer
- ✓ Si la demande de prise en charge avant 18h00

Appel Jour 0	Collecte J+1	Collecte J+2	Collecte J+3
Avant 18h00	x	x	
Après 18h00		x	x

➤ Rythme tenu jusqu'au 16 août, retard avec le week-end et l'augmentation des mortalités

- ✓ Le 19/08 à 13h30 : secteur des Avenières : 31 cheptels collectés, encore 45 à faire
secteur du Vercors : 35 cheptels collectés, encore 43 à faire




Equarrissage : Provalt

➤ Chiffres mortalité en Isère, semaines 31 à 34


BOVINS :

La mortalité est augmentée de 1.3 en moyenne sur les 4 dernières semaines.



CAPRIINS :

La mortalité est augmentée de 1,6 en moyenne sur les 4 dernières semaines toutes classes d'âge confondues.




Equarrissage :


➤ Chiffres mortalité en Isère, semaines 31 à 34

OVINS :


La mortalité est augmentée de 2.5 en moyenne sur les 4 dernières semaines toutes classes d'âge confondues.



Agneaux
La mortalité n'est pas augmentée, ce qui confirme que ce sont plutôt les adultes qui sont atteints.




Jeunes (1 à 12 mois)
La mortalité est augmentée de 2.1 en moyenne.




Agnelles (12-18 mois)

La mortalité est augmentée de 1.6 en moyenne.




Antenais (12-18 mois)

La mortalité est augmentée de 5.7 en moyenne.




Brebis

La mortalité a été multipliée par 4.7 en moyenne.



Béliers

La mortalité a été multipliée par 6 en moyenne.



FCO BTV 3



Actualité sanitaire : FCO 3



Fièvre Catarrhale Ovine (Sérotype 3) : Début en septembre 2023 aux Pays-Bas.
Forte progression vers le Sud au mois de mai : **Allemagne, à 70 km de la France.**

Pays-Bas : 4 463 foyers confirmés par PCR en 2024

60 % concernent des ovins, avec **71,4 % de mortalité !!**

2 200 élevages bovins touchés (laitiers et jeunes bovins).

Diminution de la production laitière et augmentation de la mortalité des adultes.

Belgique : 10 foyers depuis le 09/10/2023

(7 ovins, 3 bovins) => 515 cas depuis le 1^{er} juin,

Royaume Uni : 73 foyers dans 4 comtés. Mesures allégées (plus d'abattage systématique des positifs et reprise des mouvements)

Allemagne : 1^{er} cas le 27/04/2024. 70 foyers confirmés BTV3 (sur 2 467 foyers (BTV3+ non précisé)




Figure. Localisation des foyers de FCO de sérotype 3 en Europe (source : Sciensanno pour la Belgique, WAHIS OMSA pour le Royaume-Uni, et WAHIS OMSA et ADIS pour l'Allemagne consultés le 13/05/2024). NB : en Allemagne seul le foyer détecté le 27/04/2024 est issu d'ADIS.




Actualité sanitaire : FCO 3

Belgique : Juillet 2024 : foyers à la frontière belge

France : semaine 32 – premier foyer

41 foyers (14/08/24)

Aisne, Ardennes, Marne, Moselle, Nord




Actualité sanitaire : FCO 3 : L'Isère passe en zone régulée

30 août : la FCO est en Saône et Loire : la moitié Nord de l'Isère passe en zone régulée.

PAS DE FCO 3 EN ISERE

⇒ Limitations de mouvements

- pour sortir de la zone régulée
(Désinsectisation 14j + PCR FCO négative + départ dans les 14 jours)
- Pour les concours et comices : les bovins de la zone indemne ne peuvent pas venir
- Pour les achats et retour d'alpage : les bovins peuvent passer de la zone indemne à la zone régulée



Actualité sanitaire : FCO 3

Etude réalisée aux Pays-Bas du 04/09/2023 au 31/10/2023 :

- Durée de l'épisode dans un cheptel : 9 à 10 semaines
- Aucune surmortalité sur les chèvres
- Ovins : en moyenne 25% mortalité durant 6 semaines d'infection, adultes plus touchés
- Bovins : baisse de production laitière → 1kg/VL/jour avec symptômes
- Bovins : mortalité, avec signes cliniques, jusqu'à x 3,5 en plus par rapport aux années précédentes
- Bovins : mortalité, sans signes cliniques mais cheptel dans la zone réglementée, jusqu'à x 1,5 en plus

/!\ chiffres sous-estimés, foyers toujours en cours suite à l'étude




Photo C.I.R.A.D.

Actualité sanitaire : FCO 3

➤ Vaccination uniquement pour zone régulée et zone tampon : ~~ISERE~~ => **L'Isère en fait maintenant partie depuis le 30/08/2024**, (Haut de France, Grand Est, Normandie, Ile de France, Centre Val de Loire, Bourgogne Franche Comté)

✓ Du 12 Août au 31 décembre 2024

Les vétérinaires ont la charge de la commande-prescription-délivrance du stock de vaccin commandé par l'Etat (1,1 millions doses pour ovins ; 5,3 millions doses pour bovins) , commande sur Calypso.

- Bluevac 3 (CZV) pour bovins – 252 mL (72% commandé) : 2 injections => **rupture des doses commandées par l'Etat**
- Bluevac 3 (CZV) pour bovins – 100 mL (16% commandé) : 2 injections
- Bultavo 3 (Boehringer) pour ovins – 50 mL (94% commandé) : 1 injection (étude en cours pour bovins) => **rupture des doses commandées par l'Etat**
- Syvazul 3 : étude en cours

➤ ~~En AURA : pas de prise en charge du vaccin pour BTV 3, même à venir.~~

~~✓ Pour l'instant vaccin ovin disponible pour nous mais pas encore bovin.~~

~~✓ Vaccin Bultavo 3 à commander directement au laboratoire fabricant : Boehringer~~



Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes passe en zone vaccinale volontaire payée par l'Etat : vous avez accès aux doses gratuites (à commander auprès des vétérinaires sur la plateforme CALYPSO)

/!\ La vaccination contre le sérotype 3 diminue la virémie ≠ ne l'empêche pas /!



Encore des questions ?





Merci de votre attention

