

Vaccins utilisables en France										
SPECIFICATIONS RCP DES VACCINS										
Maladie	Laboratoire fabricant	Nom du vaccin	Laboratoire distributeur en France	Accès du vaccin	Espèce(s) visée(s)	Primo-vaccination Sous-cutanée (SC) Intramusculaire (IM)	Age mini	Délai installation immunité complète après primovaccination	Durée d'immunité	Usage
FCO	Boehringer-Ingelheim	BTV Pur 4 et 8	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire et PSE	Bovin Ovin Autre ¹	2 inj à 3-4 sem (1ml SC)	2,5 mois	3 sem	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
	SYVA ²	Syvazul 4 et 8²	Inovet	Vétérinaire et PSE	Ovin ² Bovin Autre ¹	1 seule inj (2ml SC) 2 inj à 3 sem (4ml IM)	3 mois	39 jours 21 jours	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
	CZV	Bluevac 8	Melchior	Vétérinaire et PSE	Bovin Ovin Autre ¹	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois 2,5 mois	31 jours 21 jours	12 mois	Protection sanitaire Mouvement
	Boehringer-Ingelheim	Bultavo 3	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin Ovin	2 inj à 3 sem (1ml IM) 1 seule inj (1 ml SC)	2,5 mois 3 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire <i>Mouvement³: Bovin uniquement⁴</i>
	CZV	Bluevac 3	Melchior	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin ³ Ovin ³	2 inj à 3-4 sem (4ml SC) 2 inj à 3 sem (2ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire ⁵
MHE	CEVA	Hepizovac	CEVA	Vétérinaire uniquement (ATU)	Bovin	2 inj à 3 sem (4ml SC)	2 mois	3 sem	Non déterminé	Protection sanitaire Mouvement ³

1-Utilisable pour d'autres espèces dans le cadre de la cascade (protocole à adapter par le vétérinaire)

2-Pratique pour les ovins car une seule injection

3-L'utilisation possible du vaccin dans le cadre des mouvements dépend du pays destinataire

4-Certains pays acceptent des mouvements avec ce vaccin pour les ovins pour certaines de leurs zones

5-Certains pays acceptent des mouvements avec ce vaccin pour les ovins et les bovins pour certaines de leurs zones